

মাটি কঁঠাল বোৱাৰ সময় : এপ্ৰিলৰ পৰা অক্টোবৰ মাহ।

মাটি কঁঠালৰ পৰিচৰ্যা : এবছৰত প্ৰায় তিনি-চাৰিবাৰ মান আনবস গছৰ মাজত গজা ঘাহ-বন বিলাক চাফা কৰিব লাগে। হাতেৰে চাফ-চিকুণ নকৰি বাসায়নিক সাৰ প্ৰয়োগ কৰিও পৰিস্কাৰ কৰিব পাৰি। ডিউবননামৰ ঔষধবিধ প্ৰথম বছৰত ব্যৱহাৰ কৰি বহুত পৰিমাণৰ ঘাহ-বন চাফ-চিকুণ কৰিব পাৰি। ঔষধবিধ আনবাসৰ বাগানৰ মাজত থকা ঘাহ-বন বিলাকত স্প্ৰে কৰিব লাগে। ইয়াৰ কাৰণে কলা পোৱিখিনত (৫০ Micron) ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি।

কেতিয়াবা যদি দীঘলীয়া খৰাং বতৰ হয় সূৰ্যৰ তাপৰ পৰা যাতে ফলবিলাক বেয়া হৈ নাযায় তাৰবাবে আনাবসৰ বাগানত দৈনন্দিন পানী দিব লাগে। সূৰ্যৰ তাপৰ পৰা বক্ষা পাবলৈ সাময়িকভাৱে ছাঁ পৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। পূৰ্ণ ফলবিলাক ইয়াৰ পাতবিলাকেৰে ঢাকি দি সূৰ্যৰ তাপ আৰু বিভিন্ন আক্ৰমণৰ পৰা বক্ষা কৰিব পাৰি।

মাটি কঁঠালৰ খেতি :

মাটি কঁঠালৰ বাবে সাধাৰণতে উষ্ণ আৰু নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু উপযোগী। মাটি কঁঠাল গছ বোৱাৰ পৰা ২০-২৪ মাহৰ ভিতৰত গুটি দৰে। ফলৰ ওপৰৰ অংশত থকা আগটো ফল ছিঙাৰ পাছত তাৰ পৰা ছিঙি কলেই নতুন গছ হয়। ব্যৱসায়িকভাৱে ব্যাপক ৰূপত মাটি কঁঠালৰ খেতি কৰাৰ বাবে ইয়াৰ গুটিও ব্যৱহাৰ কৰা হয়; কিন্তু গুটিৰ পৰা হোৱা মাটি কঁঠালে পূৰ্বৰ গুণ কিছু পৰিমাণে হেৰুওৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। ই এবিধ গুল্ম উদ্ভিদ। ইয়াৰ গুৰিৰ পৰাও পোখা মেলি নতুন গছ গজে। এই পোখাবোৰ মূল গছৰ পৰা কাটি একুৱাই নতুনকৈ বোৱাৰ প্ৰয়োজন। অন্যথাই মূল গছৰ লগতে পোখাৰ পৰা হোৱা গছৰ ফলৰ উৎপাদনৰ নেতিবাচক প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে।

ৰোগ :

মাটি কঁঠালৰ খেতিত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগে দেখা দিব পাৰে। ইয়াৰ ভিতৰত মাটি কঁঠালত ফুটি পোকে সৃষ্টি কৰা ৰোগ গুৰুতৰ হ'ব পাৰে। এই ৰোগে মাটি কঁঠালৰ লগতে ইয়াৰ কোঁহৰো ক্ষতিসাধন কৰে। ইয়াৰ উপৰি পিংক ৰোগ, শিপাৰ পৰা হোৱা ৰোগ আদি। মাটি কঁঠালৰ ক্ষতিসাধন কৰা পোকবোৰৰ ভিতৰত চৰহা, ফুতি আদি।

মাটি কঁঠাল :

মাটি কঁঠালক আনাবস ৰূপেও জনা যায়। ই এবিধ বসাল সুস্বাদু ফল। মাটি কঁঠাল কেচাই খোৱা হয়। ইয়াৰ উপৰি ব্যঞ্জন, বস, জেলী আদিও ইয়াৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা হয়। মাটি কঁঠালত ভালেমান পুষ্টিকৰ দ্ৰব্য আছে। ইয়াৰ ভিতৰত মেংগানিজ আৰু ভিটামিন চি অন্যতম। ইয়াৰ উপৰি ই হজম শক্তিও বঢ়ায়। অৱশ্যে ইয়াত থকা কিছুমান দ্ৰব্যৰ বাবে মাটি কঁঠালে সকলোকে নুসুহে আৰু এলাৰ্জীৰ দৰে বিকাৰৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। ইয়াৰ পাত দীঘল হয় আৰু পাতৰ আহবোৰ কাগজ তৈয়াৰ কৰাত আৰু সাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি।

মাটি কঁঠালৰ বিভিন্ন জাত :

কিউ, কুইন আৰু মোৰিটিয়াচ

মাটি : উপযুক্ত নলা-নৰ্দমা থকাৰ লগতে অলপ পৰিমাণে এচিড থকা যিকোনো মাটিত আনাবস বৃদ্ধি পায়।

আনাবসৰ বৃদ্ধি- আনাবসৰ উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিব পাৰি ইয়াৰ শিপাৰ পৰা ওলোৱা গজালি ৰোপন কৰি, ইয়াৰ ডালৰ অংশ কাটি আনি ৰোপন কৰি আৰু মূৰৰ অংশ ৰোপন কৰি অৱশ্যে এইখিনি কৰিলে হ'লে ইয়াৰ বয়স কমেও ৫-৬ মাহ হ'ব লাগে তাৰ পিছত বোৱা অংশবিলাকে ১২ মাহৰ ভিতৰলৈ ফুলিব ধৰে, কিন্তু মূৰৰ অংশ বোৱাৰ ১৯-২০ মাহৰ পিছতহে ফুল ফুলে।





কীটনাশক :

মাটি কঁঠালৰ খেতি কৰিবলৈ লওঁতে প্ৰতি হেক্টৰ মাটিত ২০ কিল'গ্ৰাম কীটনাশক পানীত মিহলাই ছটিয়াব লাগে। মাটি কঁঠালত ব্যৱহাৰ কীটনাশকৰ ভিতৰত অৰ্গেনফছফেট, অৰ্গেনক্লৰিনেজ আদি।

খেতি চপোৱা :

মাটি কঁঠাল পূৰ্ব হোৱাৰ পাছত ইয়াক ছিঙিব লাগে। মাটি কঁঠালবোৰ পৃথকে ৰাখিব লাগে, কিয়নো ই সহজে নষ্ট হৈ যাব পাৰে।



উদ্যান শস্য আৰু খাদ্য সংসাধন সঞ্চালকালয়ৰ
দ্বাৰা প্ৰকাশিত
খানাপাৰা, গুৱাহাটী-২২

মাটি কঁঠাল



Pineapple