



### ফুলকবি :

ফুলকবি ব্ৰাছিকাছে গোট্ৰব। ব্ৰাছিকা অ'লেবেচিয়া প্ৰজাতিৰ এবিধ পাচলি। ই গুটিৰ পৰা হোৱা এবিধ বছেৰেকীয়া উদ্ভিদ। অৰ্থাৎ বছৰৰ এটা সময়তহে ইয়াৰ উৎপাদন কৰিব পাৰ যায়। সাধাৰণতে ইয়াৰ ওপৰৰ (মূৰৰ) বগা অংশটোহে খোৱা হয়। ফুল কবি আৰু ব্ৰ'ক'লিৰ দেখাত সাদৃশ্য আছে, অৱশ্যে ইয়াৰ ওপৰৰ অংশটোত ব্ৰ'ক'লিৰ দৰে ফুল নহয়। অ'লেবেচিয়া ব্ৰ'ক'লি, ব্ৰুছেলছৰ থোপা, বন্ধাকবি, কলাৰ্ড গ্ৰীনছ আৰু কেল একেটা গোট্ৰব। অৱশ্যে এই আটাইবোৰ ভিন ভিন ধৰণে বিকশিত হোৱা একেটা প্ৰজাতিৰে পাচলি। ফুলকবিত কাৰ্ব'হাইড্ৰেট আৰু চৰ্বি কম পৰিমাণে থাকে যদিও ইয়াত আঁহ যথেষ্ট পৰিমাণে থাকে আৰু ই পুষ্টিৰ দ্ৰব্যৰে ভৰপূৰ। ফুলকবি ৫ মিনিট সিঁজালে ইয়াৰ পুষ্টিৰ দ্ৰব্যসমূহ ২০-৩০ শতাংশ হ্ৰাস পায়, ১০ মিনিটত ৪০-৫০% আৰু ৩০ মিনিট সিঁজালে ৭৫% হ্ৰাস পায়। অৱশ্যে আন ধৰণে বান্ধিলে যেনে ভাপত দিলে, মাইক্ৰ'ৱেভত দি বা ভাজি (ষ্টিয়াৰ ফ্ৰাইং) কৰিলে ইয়াৰ পুষ্টিৰ দ্ৰব্যসমূহৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ কোনো প্ৰভাৱ নপৰে।

বিৱৰণ	আগতীয়া	মধ্যমীয়া	শেহতীয়া	হাইব্ৰীড
জাত	আৰ্লি কুঁৱৰী, পুচা কেট্‌কী, পুচা দীপালী, কাৰ্তিকা অগ্ৰহানী	ইম্প্ৰভ জাপানীজ, পুচা চিনথেটিক, পুচা স্নবল	স্নবল ১৬	স্নবল, চামাব কুইন
বীজৰ পৰিমাণ	৮০ গ্ৰাম প্ৰতি বিঘাত	৫৫ গ্ৰাম প্ৰতি বিঘাত	৮০ গ্ৰাম প্ৰতি বিঘাত	৪০ গ্ৰাম
বীজ	জুলাইৰ	ছেপ্টেম্বৰ	নবেম্বৰ	—
সিঁচাৰ সময়	মাজভাগৰ পৰা আগষ্টৰ প্ৰথম সপ্তাহলৈ	প্ৰথম সপ্তাহৰ পৰা অক্টোবৰৰ শেষ সপ্তাহলৈ	প্ৰথম সপ্তাহৰ পৰা শেষ সপ্তাহলৈকে	
বোপণ	৪৫x৪৫	৬০x৬০	৪৫x৪৫	৪৫x৪৫
দূৰত্ব	ছেপ্টিমিটাৰ	ছেপ্টিমিটাৰ	ছেপ্টিমিটাৰ	ছেপ্টিমিটাৰ



### সাৰ প্ৰয়োগ :

পচন সাৰ ১৫-২০ কুইণ্টল, ইউৰিয়া -২৪ কিলোগ্ৰাম, একক ছুপাৰ ফচফেট-৪৮ কিলোগ্ৰাম আৰু পটেছিয়াম ১২ কিলোগ্ৰাম আৰু বৰাক্স-১ কিলোগ্ৰাম। ইউৰিয়া সাৰৰ আধা আৰু সমুদায় ছুপাৰ, পটাছ আৰু বৰাক্স পুলি বোৱাৰ আগেয়ে মাটিত প্ৰয়োগ কৰিব লাগে। ইউৰিয়া সাৰৰ বাকী আধা পুলি বোৱাৰ ৩০ দিনৰ পিছত মাটি চপোৱাৰ সময়ত প্ৰয়োগ কৰিব লাগে। পুলিবোৰ ঠন ধৰি উঠাৰ পিছত ১৫-২০ দিনৰ মূৰে মূৰে অনুসাৰ যেনে, গ্ৰীন হাৰভেষ্ট-অল ক্ৰপ (১০ লিটাৰ পানীত ৭৫ গ্ৰাম) আৰু ক্ৰপ বুষ্টাৰ (১০ লিটাৰ পানীত ৪০ গ্ৰাম) স্প্ৰে কৰিব লাগে।

### জলসিঞ্চন :

পুলি বোৱাৰ পিছত এবাৰ, মাটি চপোৱাৰ পিছত এবাৰ আৰু ফুল ধৰিবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ সময়ত এবাৰকৈ মুঠ ৩ বাৰ নিশ্চিত জলসিঞ্চন কৰাৰ প্ৰয়োজন। তদুপৰি খৰাং বতৰত অধিক জলসিঞ্চনৰ প্ৰয়োজন আছে।

### শস্যৰক্ষা :

পুলি বোৱাৰ পিছত গুৰি অংশ ক'লা পৰি যায় আৰু পাতবিলাক হালধীয়া পৰি মৰহি যায়। এই ৰোগ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে স্ট্ৰেপট'মাইটিন বেণ্টেৰীয়ানাশকৰ ১ গ্ৰাম প্ৰতি ১০ লিটাৰ পানীত পাতত নাইবা গুৰি অংশত ভেঁকুৰ বেমাৰ যেনে, গুৰি পচা, অলটাৰনেৰিয়া লিফ স্পট আদিয়ে আক্ৰমণ কৰিব পাৰে। ইয়াক নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ইন্ডিফিল এম-৪৫ নাইবা বেভিষ্টিন ভেঁকুৰনাশক পাতত স্প্ৰে কৰিব লাগে। পাত খোৱা পলু পোক নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে মালাথিয়ন ১.৫ মিলিটাৰ প্ৰতি-১ লিটাৰ পানীত মিহলাই স্প্ৰে কৰিব লাগে। অমুসাৰৰ অভাৱত ফুলকবিত নানাধৰণৰ বিসঙ্গতি হ'ব পাৰে। সেয়ে ফুলকবি ঠন ধৰি উঠাৰ পিছত প্ৰতি ১৫-২০ দিনৰ মূৰে মূৰে বজাৰত উপলব্ধ অনুসাৰ যেনে, গ্ৰীন হাৰভেষ্ট- অলক্ৰপ, ক্ৰপ বুষ্টাৰ, ট্ৰেচেল-২, মাল্টিপ্লেক্স আদি স্প্ৰে কৰিব লাগে।







### ফুলকবি

প্রতি ১০০ গ্রাম (৩.৫ OZ)ত পুষ্টিকৰ দ্রব্য

শক্তি	-	১০৪ KJ (২৫ কেলরি)
কার্ব'হাইড্রেট	-	৫ গ্রাম
চেনি	-	১.৯ গ্রাম
খাদ্য উপযোগী আঁহ	-	২ গ্রাম
চর্বি	-	০.৩ গ্রাম
প্র'টিন	-	১.৯ গ্রাম

### ভিটামিন সমূহ

থিয়ামিন (বি-১)	-	০.০৫ মিলিগ্রাম, (৪%)
বিব'ফ্লভিন (বি-২)	-	০.০৬ মিলিগ্রাম, (৫%)
নিয়াচিন (বি-৩)	-	০.৫০৭ মিলিগ্রাম, (৩%)
পেন্ট'থেনিক এচিড	-	০.৬৬৭ মিলিগ্রাম, (১৩%)
ভিটামিন (বি-৬)	-	০.১৮৪, (১৪%)
ফ'লেট (বি-৯)	-	৫৭ µg, (১৪%)
ভিটামিন (চি)	-	৪৮.২ মিলিগ্রাম, (৫৮%)
ভিটামিন (ই)	-	০.০৮ মিলিগ্রাম, (১%)
ভিটামিন (কে)	-	১৫.৫ µg, (১৫%)

### ধাতুসমূহ

কেলছিয়াম	-	২২ মিলিগ্রাম, (২%)
লো (আইরন)	-	০.৪২ মিলিগ্রাম, (৩%)
মেগনেছিয়াম	-	১৫ মিলিগ্রাম, (৪%)
মেংগানিজ	-	০.১৫৫ মিলিগ্রাম, (৭%)
ফছফবাছ	-	৪৪ মিলিগ্রাম, (৬%)
পটেছিয়াম	-	২৯৯ মিলিগ্রাম, (৬%)
ছ'ডিয়াম	-	৩০ মিলিগ্রাম, (২%)
জিংক	-	০.২৭ মিলিগ্রাম, (৩%)

### অন্যান্য দ্রব্যসমূহ

পানী	-	৯২ গ্রাম
------	---	----------



উদ্যান শস্য আৰু খাদ্য সংসাধন সঞ্চালকালৰ  
দ্বাৰা প্রকাশিত  
খানাপাৰা, গুৱাহাটী-২২

# ফুলকবি

## Califlower

